

STATISTIQUE DE **SENSIBILITE** (en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLES EN **2012** AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (1/2)

	ENTEROBACTERIES	Citrobacter freundii ³	Citrobacter koseri (ex. diversus)	Enterobacter aerogenes ³	Enterobacter cloacae ³	Escherichia coli	Klebsiella oxytoca	Klebsiella pneumoniae	Morganella morganii ³	Proteus mirabilis	Proteus vulgaris	Serratia marcescens ³	NON FERMENTATIFS	Acinetobacter sp	Pseudomonas aeruginosa	Stenotrophomonas maltophilia
N¹ =		141	121	87	431	4130	211	778	148	411	129	122		107	1266	129
Ampicilline		0	0	0	0	47	0	0	0	58	0	0		² R	² R	² R
Amoxicilline-clav.		0	97	0	0	80	91	86	0	88	87	0		² R	² R	² R
Pip-Tazobactam		78	93	80	81	92	92	88	89	98	96	93			76	² R
Ceftriaxone		66	98	78	74	89	94	85	90	99	92	93		² R	² R	² R
Ceftazidime		63	98	78	73	89	97	85	87	98	95	94			76	² R
Céfépime		96	98	99	91	94	98	94	98	99	98	98			77	² R
Ertapenem		99	100	84	82	99	100	96	100	100	100	96		² R	² R	² R
Imipénème		100	100	99	100	100	100	99	90	99	91	98		91	74	² R
Méropénème		100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	98		91	77	² R
Amikacine		100	100	100	100	98	100	99	100	99	98	90		93	77	² R
Gentamicine		98	100	98	98	92	99	94	95	82	94	99		93	77	² R
Tobramycine		96	100	99	97	91	99	93	99	88	97	81		93	91	² R
Ciprofloxacin		98	99	96	98	80	98	88	91	73	98	99		91	70	
Lévofloxacin		98	99	96	98	80	98	88	91	73	98	99		92	68	82
Co-trimoxazole		95	96	98	95	68	97	87	90	54	71	100		89	0	98
Fosfomycine		100	98	90	50	99	59	79	0	83	95	85		² R		² R
Nitrofurantoïne		85	44	4	18	98	50	19	0	1	3	2				
Colistine		98	100	100	99	100	100	100	0	0	0	0			99	
Minocycline																98

Sont incluses: Une souche par patient et par épisode. Si une deuxième souche avec un antibiogramme différent est isolée durant cet épisode, elle est aussi incluse.

Les cases vides indiquent que l'antibiotique n'est pas testé de routine.

¹ Nombre maximal de souches testées. Certains antibiotiques sont testés pour toutes les souches, d'autres sur un nombre plus restreint.

² Résistance naturelle du genre ou de l'espèce.

³ Plus de 70% des souches de ces espèces produisent une céphalosporinase inductible; les céphalosporines de 2ème et 3ème génération sont déconseillées parce qu'une souche sensible peut développer une

STATISTIQUE DE SENSIBILITE (en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLES EN 2012 AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (2/2)																							
	Staphylococcus aureus (SA) (tous)	MSSA (Méticilline/Oxacilline S)	MRSA (Méticilline/Oxacilline R)	Staphylocoques à coagulase négative (tous) (SE)	MSSE (Méticilline S)	MRSE (Méticilline R)	Staphylococcus lugdunensis	Staphylococcus saprophyticus	Enterococcus faecalis	Enterococcus faecium	Streptococcus pyogenes (gr.A)	Streptococcus agalactiae (grB)	groupe milleri (anginosus, constellatus, intermedius)	Streptococcus bovis	groupe viridans	Streptococcus pneumoniae (SPN) (tous)	SPN Pénicilline S	SPN Pénicilline I ou R	Haemophilus influenzae	Campylobacter	Salmonella	Shigella ⁵	Candida albicans
N =	1833	1533	300	676	221	455	60	58	1297	289	91	355	198	36	117	164	137	27	270	127	22	31	84
Ampicilline	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	100	10	⁴ Péni	⁴ Péni	100	100	84	90	⁴ Péni	41	69		73	65	
Pénicilline	19	23	0	14	40	0	45	50			100	100	100	100	85	83	100	0					
Oxacilline	84	100	0	35	100	0	98	93	R	R													
Amoxicilline-clav.	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Ampi	⁴ Ampi	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni		⁴ Péni		78		91	87	
Pip-Tazobactam	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Ampi	⁴ Ampi							⁴ Péni						
Céfalotine	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R							⁴ Péni						
Cefuroxime	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R							⁴ Péni						
Cefpodoxime																							
Ceftriaxone	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R	⁴ Péni	⁴ Péni	100	100	93	95	⁴ Péni	85	83		100	97	
Ceftazidime	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R									99				
Céfépime	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa									⁴ Péni						
Imipénème	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	100	10							⁴ Péni						
Amikacine	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta															
Gentamicine	87	96	39	53	95	33	97	100	79	69													
Ciprofloxacin	80	93	14	47	94	24	98	100												54	95	84	
Levofloxacin	80	94	14	46	94	23	97	98			96	92				100	100	100			95	84	
Clarithromycine	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery			⁴ Ery	⁴ Ery				83	94	33		⁴ Ery			
Erythromycine	74	85	17	42	70	29	93	50			92	81				83	94	33		96			
Clindamycine	77	88	18	55	89	39	95	93			95	86	86	61	97	89	95	56					
Co-trimoxazole	99	100	99	66	94	52	100	100								86	90	67	79		95	7	
Fucidine	94	94	97	43	60	35	93	16															
Rifampicine	99	100	98	96	99	95	100	100															
Tétracycline	96	96	94	49	76	36	98	91			75	14				89	96	52		72			
Teicoplanine	100	100	100	95	100	94	98	100	100	100													
Vancomycine	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100					
Fluconazole																							98
Voriconazole																							98

⁴ Les abréviations en lettres renvoient au résultat de l'antibiotique représentant de la famille: ex: Oxa renvoie au résultat de l'Oxacilline

⁵ **Shigella** (années 2008-2012)