

STATISTIQUE DE **SENSIBILITE** (en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLES EN **2013** AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (1/2)

	ENTEROBACTERIES	Citrobacter freundii ³	Citrobacter koseri (ex. diversus)	Enterobacter aerogenes ³	Enterobacter cloacae ³	Escherichia coli	Klebsiella oxytoca	Klebsiella pneumoniae	Morganella morganii ³	Proteus mirabilis	Proteus vulgaris	Serratia marcescens ³	NON FERMENTATIFS	Acinetobacter sp	Pseudomonas aeruginosa	Stenotrophomonas maltophilia
N ¹ =		126	132	93	412	4363	231	799	175	393	127	155		94	1260	135
Ampicilline		0	0	0	0	50	0	0	0	62	0	0		² R	² R	² R
Amoxicilline-clav.		0	98	0	0	78	88	83	0	88	84	0		² R	² R	² R
Pip-Tazobactam		78	98	68	75	91	88	83	97	99	99	97			83	² R
Ceftriaxone		80	94	71	73	91	92	84	98	100	94	93		² R	² R	² R
Ceftazidime		75	94	70	73	92	99	84	90	99	97	94			85	² R
Céfépime		98	95	96	91	95	100	91	97	100	99	97			84	² R
Ertapenem		97	100	93	84	100	100	98	100	100	100	99		² R	² R	² R
Imipénème		99	100	98	100	100	100	99	67	97	91	100		91	77	² R
Méropénème		100	100	98	100	100	100	99	100	100	100	100		91	81	² R
Amikacine		97	100	99	100	98	100	98	98	99	99	95		92	79	² R
Gentamicine														88	81	² R
Tobramycine		91	100	99	98	92	100	91	96	86	96	83		90	90	² R
Ciprofloxacin		92	98	92	97	83	97	87	93	79	99	95		91	76	
Lévofloxacin		92	98	92	97	83	97	87	93	79	99	95		90	72	87
Co-trimoxazole		89	98	98	98	71	97	84	88	63	76	98		94	0	91
Fosfomycine		100	99	76	56	99	66	78	1	83	91	79		² R		² R
Nitrofurantoïne		89	39	9	19	97	55	16	2	2	2	0				
Colistine		99	100	100	99	100	100	99	0	0	0	0			99	
Minocycline																99

Sont incluses: Une souche par patient et par épisode. Si une deuxième souche avec un antibiogramme différent est isolée durant cet épisode, elle est aussi incluse.

Les cases vides indiquent que l'antibiotique n'est pas testé de routine.

¹ Nombre maximal de souches testées. Certains antibiotiques sont testés pour toutes les souches, d'autres sur un nombre plus restreint.

² Résistance naturelle du genre ou de l'espèce.

³ Plus de 70% des souches de ces espèces produisent une céphalosporinase inductible; les céphalosporines de 2ème et 3ème génération sont déconseillées parce qu'une souche sensible peut développer une

STATISTIQUE DE SENSIBILITE (en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLES EN 2013 AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (2/2)																							
	Staphylococcus aureus (SA) (tous)	MSSA (Méticilline/Oxacilline S)	MRSA (Méticilline/Oxacilline R)	Staphylocoques à coagulase négative (tous) (SE)	MSSE (Méticilline S)	MRSE (Méticilline R)	Staphylococcus lugdunensis	Staphylococcus saprophyticus	Enterococcus faecalis	Enterococcus faecium	Streptococcus pyogenes (gr.A)	Streptococcus agalactiae (grB)	groupe milleri (anginosus, constellatus, intermedius)	Streptococcus bovis	groupe viridans	Streptococcus pneumoniae (SPN) (tous)	SPN Pénicilline S	SPN Pénicilline I ou R	Haemophilus influenzae	Campylobacter	Salmonella	Shigella ⁵	Candida albicans
N =	1695	1508	187	698	239	459	70	82	708	221	87	121	183	19	81	165	136	29	308	92	34	27	90
Ampicilline	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	100	17	⁴ Péni	⁴ Péni	100	100	80	81	⁴ Péni	42	71		82	52	
Pénicilline	20	23	0	14	35	0	37	23			100	100	100	100	80	82	100	0					
Oxacilline	89	100	0	37	100	0	100	93	R	R													
Amoxicilline-clav.	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Ampi	⁴ Ampi	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni	⁴ Péni		⁴ Péni		82		94	85	
Pip-Tazobactam	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Ampi	⁴ Ampi							⁴ Péni						
Céfalotine	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R							⁴ Péni						
Cefuroxime	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R							⁴ Péni						
Cefpodoxime																							
Ceftriaxone	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R	⁴ Péni	⁴ Péni	100	100	88	90	⁴ Péni	76	79		100	96	
Ceftazidime	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	R	R									99				
Céfépime	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa									⁴ Péni						
Imipénème	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	⁴ Oxa	100	14							⁴ Péni						
Amikacine	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta	⁴ Genta															
Gentamicine	91	95	56	56	93	36	99	100	79	53													
Ciprofloxacin	86	94	20	48	94	24	100	100												41	68	70	
Levofloxacin	86	94	20	47	92	23	99	98			98	93				98	99	94			68	70	
Clarithromycine	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery			⁴ Ery	⁴ Ery				⁴ Ery	⁴ Ery	⁴ Ery		⁴ Ery			
Erythromycine	77	84	20	41	68	27	94	54			92	79				78	90	27		93			
Clindamycine	79	86	24	55	87	38	94	88			97	83	88	58	84	83	92	45					
Co-trimoxazole	99	100	97	64	96	47	100	93								86	88	76	79		88	11	
Fucidine	94	95	90	43	63	33	93	13															
Rifampicine	99	100	94	97	98	96	100	100															
Tétracycline	95	96	87	52	74	40	94	88			78	11				81	90	42		66			
Teicoplanine	100	100	100	98	99	98	100	100	100	99													
Vancomycine	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100					
Fluconazole																							94
Voriconazole																							96

⁴ Les abréviations en lettres renvoient au résultat de l'antibiotique représentant de la famille: ex: Oxa renvoie au résultat de l'Oxacilline

⁵ **Shigella** (années 2009-2013)