

# SUIVI DES ENFANTS AVEC VIRAGE DE MANTOUX (tuberculose primaire asymptomatique)

## **Avant le début du traitement**

- FSC, CRP, VS
- ASAT, ALAT, GGT, phosphatase alc., bilirubine, créatinine

**N.B.** Si le cas index est connu, obtenir l'antibiogramme

## **Instauration du traitement pour une durée de 9 mois**

Isoniazide (Rimifon®) 10 mg/kg/j à prendre à jeûn

### **A 1 mois de traitement**

- contrôle clinique
- INH urinaire
- ASAT, ALAT :
  - si normaux, pas de contrôle ultérieur
  - si anormaux, contrôler une fois par mois (accepter 3-5 fois la norme si asymptomatique)

### **A 2 et 3 mois de traitement**

- contrôle clinique
- INH urinaire
- tests hépatiques si symptomatologie digestive

### **A 3 mois de traitement**

si bonne compliance médicamenteuse (INH urinaire positif à 3 reprises)

- contrôles cliniques **à 6 et 9 mois** de traitement
- INH urinaire une fois par mois
- tests hépatiques si symptomatologie digestive

si compliance médiocre

- téléphoner **lors de chaque contrôle négatif** pour s'assurer de la bonne compréhension, de la disponibilité du médicament et insister sur l'importance de la prise régulière du traitement
- contrôles cliniques une fois par mois
- INH urinaire une fois par mois
- tests hépatiques si symptomatologie digestive

N.B : Tous les enfants suivis pour un virage de Mantoux doivent bénéficier d'un rattrapage vaccinal.