

EMS - Manuel - Gastro-entérite à Norovirus - Epidémie: instruction de travail



Epidémie de	gastro-entérites à Norovirus
--------------------	------------------------------

Epidemie de gastro-enterites a Norovirus	
Désinfection des mains	 Lors d'épidémie à Norovirus, privilégier la désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique à base d'éthanol ou de peroxyde d'hydrogène comme par exemple : Stérillium[®] Virugard, Skinman[®] Intensiv, Softa-Man[®] acute, Desderman[®] Pure, Stérillium[®] Gel, Biosanitizer^H
Désinfection de l'environnement	 Dismozon[®], Perform[®], Biosanitizer^S ou Eau de Javel 2% (à diluer pour atteindre une concentration de 0,5% à 1%) pour le nettoyage des surfaces mobiles et fixes y compris les sanitaires désinfecter l'environnement bi-quotidiennement
Traitement du linge	 transporter le linge dans un sac en plastique, imperméable et hermétiquement fermé laver le linge en machine à une température > à 60℃ ajouter au produit à lessive un produit désinfectant pour les textiles ne pouvant être lavés à des températures > à 60℃ (oxy gène actif ou autre désinfectant pour textile) Remarque : pour les textiles ne pouvant être lavés qu'à sec, l'OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) propose de les entreposer séparément pendant 14 jours dans un sac hermétiquement fermé avant leur prise en charge.
Isolement de contact	 maintenir le résident en chambre maintenir les Mesures Additionnelles de contact 48h après la fin des symptômes
Mesures pour le personnel	évincer immédiatement tout personnel présentant des symptômes de gastro-entérite ceci jusqu'à 48 h après la fin de leurs symptômes
Déclaration de l'épidémie	annoncer l'épidémie au Médecin cantonalavertir la cellule régionale HPCI