


DOULEUR EN CAS DE TRAUMATISMES DES MEMBRES OU BRULURES



1. Rassurer (parents)
2. Contrôler alignement membres + perfusion et sensibilité
3. Immobiliser
4. Installer en douceur

MORPHINE
i.v., i.m., s.c. : ampoules à 1% (1 ml = 10 mg) ou à 0.1% (1ml = 1 mg)
Administer lentement et titrer selon la réponse

PARACETAMOL
Per os : 20 mg/kg toutes les 6 heures
i.v. : paracétamol molécule pure (perfalgan R), 15 mg/kg/dose.
N.B. Injection en 15 min.

IBUPROFENUM (BRUFEN (R))
p.r. : 10-15 mg/kg
Déconseillé en cas de risque important d'hémorragie: inhibe l'agrégation plaquettaire

DICLOFENAC (VOLTARENE (R))
p.r. : 1-2 mg/kg
N.B. Pic sérique 1 h après administration rectale.
Déconseillé en cas de risque important d'hémorragie: inhibe l'agrégation plaquettaire.

TRAMAL (TRAMADOL (R))
i.v., p.o. : 2 mg/kg

ECHELLE FLACC	
<u>Visage</u>	0 : pas d'expression particulière ou sourire 1 : grimaces occasionnelles, sourcils froncés, renfermé ou désintéressé 2 : tressaillements du menton occasionnels ou constants, mâchoires serrées
<u>Jambes</u>	0 : position normale ou détendue 1 : mal à l'aise, bougeant sans cesse, tendu 2 : donne des coups de pieds, jambes repliées
<u>Activité</u>	0 : couché tranquillement, position normale, bouge facilement 1 : se tortille, bouge d'un côté à l'autre, tendu 2 : arqué, rigide, mouvements désordonnés
<u>Pleurs</u>	0 : pas de pleurs (éveillé ou endormi) 1 : geint ou pleurniche, plaintes occasionnelles 2 : pleure tout le temps ou hurle ou sanglote, plaintes fréquentes
<u>Consolabilité</u>	0 : content et détendu 1 : rassuré par le contact occasionnel, lorsque pris dans les bras, par les paroles, peut être distrait 2 : difficile à consoler ou réconforter

