VACCINATION COMPLETE	ANTITOXINE	RAPPEL ANTI-TETANIQUE
<p>Une vaccination est considérée comme complète si elle comprend au moins 3 doses, même si les intervalles ont été plus longs que ceux recommandés.</p> <p>Dans le doute, vérifier le carnet de vaccination le jour même ou agir comme si la vaccination n'avait pas été faite ou était incomplète.</p>	<p>Tetuman (R) (dose unique) 250-500 UI ou 5-10 U/kg i.m. NB: Pour les nouveau-nés, la protection dépend de l'immunité maternelle durant la grossesse</p>	<p>TeAnatoxal Berna, 0.5L i.m. Contre-indication : - réactions neurologiques anamnestiques - patient sérieusement atopique : test intraédermique préalable</p> <p>* Entre 4 et 7 ans : si l'enfant n'a pas reçu sa 5^e dose de vaccin, donner le rappel anti-Te sous forme du vaccin combiné DTaP-IPV (Infanrix (R) ou Tetravac (R)) Si > 7 ans : donner dT adulte (Berna) ou Ditanrix (R)</p>

A PROPOS DU TETANOS

1. Se méfier en particulier de toute lésion où les conditions d'anaérobiose sont favorisées : lésions profondes ou punctiformes, souillées, non débridables (face), contaminées ou dévitalisées.
2. Le *Clostridium tetani* est ubiquitaire sous forme sporulée : terre, rosiers, excréments, poussières domestiques.
3. Clinique : Incubation : 3-21 jours, en moyenne 7j. Mortalité : env. 50% (99,5% chez le nouveau-né). Durée de la maladie : 4-6 semaines (ne confère pas d'immunité). Diverses présentations cliniques allant de l'atteinte localisée (spasme périlésionnel) jusqu'à la forme généralisée avec trismus (signe précoce, présent dans 50% des cas), dysphagie, contractures diffuses (opisthotonos) spasmes paroxystiques, voire apnées et arythmies. Le diagnostic se pose dur la base de la clinique et est confirmé par la culture de *Cl. tetani* au niveau de la plaie.
4. Traitement : Tetuman 3000-6000 UI i.m. en plusieurs fois (2 mL =250-500 UI). A administrer avant toute manipulation de la plaie qui pourrait accélérer la diffusion de la toxine.
 Localement : débridement des plaies. L'éradication du germe est obtenue par pénicilline G 100 00 UI/kg/j x 10j. Selon la gravité de l'atteinte : Myorelaxants, anticonvulsivants, intubation et respiration assistée ou contrôlée, curarisation.