




Hôpitaux Universitaires de Genève

Département de l'Enfant et de l'Adolescent

Edition 2010 - Prof. A. Gervaix, Dre K. Posfay Barbe

FIEVRE SANS FOYER : 3 MOIS-3 ANS



* Apparence toxique:

Léthargie: niveau de conscience caractérisé par un contact visuel pauvre ou absent, difficulté à reconnaître ses parents ou à interagir avec des personnes ou des objets. Mauvaise perfusion périphérique, hypo- ou hyperventilation, cyanose...

Risque clinique : SCORE DE Mc Carthy #			
Points	1	3	5
Observations	Normal	Atteinte modérée	Atteinte sévère
Qualité des pleurs	Forts, tonalité normale ou content, ne pleure pas	Sanglots ou gémissements	Faibles ou plaintifs ou tonalité aiguë
Réaction à la stimulation des parents	Content, ne pleure pas ou pleure brièvement puis stoppe.	Pleurs intermittents	Pleurs incessants ou incontrôlable.
Etat d'éveil	Si éveillé, reste éveillé Si endormi et stimulé, se réveille rapidement	Ferme yeux brièvement puis s'éveille ou éveillable ap. stimulation prolongée	S'endort ou ne se réveille pas
Couleur	Rose	Extrémités pâles ou acrocyanose	Pâle ou cyanosé marbré ou grisâtre
Hydratation	Peaux et yeux sp. et muqueuses humides	Peaux et yeux sp. et muqueuses ± sèches	Signe du pli et muqueuses sèches et/ou yeux enfoncés
Contact social	Sourit ou alerte (≤2 mois)	sourire bref ou alerte peu de temps (≤2 mois)	Aucun sourire, visage anxieux sans expression ou pas alerte (≤2 mois)

A effectuer au minimum 2 x à 30 min. d'intervalle.

Mc Carthy et risque d'infection sévère (pour enfants de 0-24 mois):

- Score < 10 (110/165 patients) : risque de 2,5% (3/110)

- Score 10-16 (42/165 patients): zone grise avec risque de 26.2% (11/42)

- Score > 16 (13/165 patients): risque de 93,3% (12/13)

Pediatrics 1982;70: 802