1. Affections causales:

- **anomalies structurales** --> par atteinte directe du tronc cérébral ou par atteinte focale d'un ou des deux hémisphères cérébraux
- coma **d'origine métabolique ou d'origine toxique** --> par atteinte simultanée des différents niveaux anatomiques du système nerveux central

Causes fréquentes:

- anoxie (encéphalopathie hypoxique-ischémique)
- désordres métaboliques (diabète décompensé, coma hépatique)
- infections du système nerveux central
- intoxications
- état de mal convulsif
- traumatisme crânien

2. Niveau de profondeur: Le score de Glasgow évalue à la fois la vigilance et la conscience

Critères	Enfant < 5 ans	Enfant 2-5 ans	Enfant 1-2 ans	Nourrisson < 1 an	
Ouverture des yeux	Spontanée	Spontanée	Spontanée	Spontanée	4
	A la parole	A la parole	A la parole	Au cri	3
	A la douleur	A la douleur	A la douleur	A la douleur	2
	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	1
Réponse verbale	Orientée	Mots/phrases appropriés	Sourire ou interaction adéquate	Sourire ou interaction adéquate	5
	Confuse	Mots/phrases inappropriés	Cris irritables	Cris irritables	4
	Inappropriée	Cris ou pleurs persistants	Cris ou pleurs inappropriés	Cris ou pleurs inappropriés	3
	Incompréhensible	Gémissements (« Grunts »)	Gémissements (« Grunts ») ou état d'agitation	Gémissements (« Grunts ») ou état d'agitation	2
	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	1
Réponse Motrice (retenir le bon côté)	Obéit à l'ordre	Obéit à l'ordre	Mouvements spontanés et dirigés	Mouvements spontanés et dirigés	6
	Localisée	Localisée	Localisée	Localisée	5
	Retrait	Retrait	Retrait	Retrait	4
	Flexion	Flexion	Flexion	Flexion	3
	Extension	Extension	Extension	Extension	2
Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	1	

3. Mesures d'urgence:

- Objectifs:**
- 1) Eviter des lésions cérébrales hypoxiques
 - 2) Eviter l'engagement / herniation du tronc cérébrale
 - 3) Traitement causale (si possible)

- Management:**
- 1) Stabilisation d'urgence
 - 2) Bilan diagnostic
 - 3) Traitement définitif

Causes à traiter rapidement:

- a) Hypoglycémie
- b) Méningite
- c) Intoxication avec des opiacées.
- d) Lésions intracrâniennes qui peuvent progresser rapidement : Trauma, Maladies cérébro-vasculaires, Infections, Néoplasies cérébrales, Hydrocéphalie

4. Critères d'admission en réanimation:

Critères absolus: - score de Glasgow < 8 après la réanimation initiale
- patient intubé et ventilé

Critères relatifs: - score de Glasgow entre 9 et 12 après la réanimation initiale
- coma instable

5. Traitement symptomatique:

A) Respiration: FiO₂ d'emblée de 0.4 à 1.0; ± intubation

- Intubation si :
- 1) **score de Glasgow < 8**
 - 2) réflexes de protection des voies aériennes absentes ou faibles
 - 3) impossibilité de maintenir les voies aérienne ouvertes
 - 4) hypoventilation (pCO₂ > 60 mmHg)
- (L'intubation est fait par le CDC des USI ou par l'anesthésiste de garde.)

B) Hypertension intracrânienne (HTIC):

Chez le patient comateux ayant une affection qui se complique souvent d'une HTIC (traumatisme grave, cause du coma pas évidente) on présume, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a une HTIC.

Traitement :

+ Tête en position élevée (30°) et neutre

+ Normoventilation (pCO₂ 35-45 mmHg)

En cas de crise de hypertension intracrânienne aiguë documentée par mesure de PIC ou signe d'engorgement : légère hyperventilation (pCO₂ 30 –35 mmHg) de courte durée.

+ Normovolémie (apports normaux de base) avec solution isotonique (NaCl 0,9%) . Pas de solution glucosée !!

En cas de PIC élevée (> 20 mmHg) perfusion de 10 ml/kg de NaCl 3% (= solution avec approx. 450mmol/l de Na) sur 30 min suivi par 0.1 ml/kg/h – 1 ml/kg/h de NaCl 3% (titration selon PIC avec le but de descendre la PIC à ≤ 20 mm Hg). Na plasmatique entre 145 à 155 mmol/l.

+ Normotension .

Seulement en cas de PIC élevée de plus de 20 mm Hg viser une pression de perfusion cérébrale (pression artérielle moyenne – PIC) de minimum 50 mm Hg avec l'aide de Noradrenaline 0.05 – 0.5 mcg/kg min.