


## FAUX-CROUP



### Score de Westley modifié - indicateur de gravité

<b>Stridor inspiratoire:</b>	
-aucun	0
-au repos, audible au stéthoscope	1
-au repos, audible sans stétho.	2
<b>Tirage:</b>	
-aucun	0
-faible	1
-modéré	2
-sévère	3
<b>Entrée d'air:</b>	
-normale	0
-diminuée	1
-sévèrement diminuée	2
<b>Cyanose:</b>	
-aucune	0
-en cas d'agitation	4
- au repos	5

### Consignes pour les parents

1. Calmer l'enfant, **éviter les situations de stress**
2. Humidificateur dans la chambre
3. Fébrifuges au besoin
4. Encourager l'enfant à boire beaucoup
5. Contrôler l'enfant toutes les deux heures
6. Si la respiration est difficile:
  - aller avec l'enfant dans la salle de bain, faire couler de l'eau chaude, porte fermée de sorte à ce que la pièce soit saturée de vapeur, pendant **10 min.**
  - si il fait frais, dehors, bien habiller l'enfant et **sortir 10 min.**
  - si il continue à avoir une toux aboyante ou des signes de détresse respiratoire, appeler un médecin

### Traitements disponibles aux urgences

- Budénoside = Pulmicort ® respules à 0.5 mg/ml ⇒ donner 4ml (2mg)
- Solution de dexaméthasone po disponible uniquement à l'hôpital
- Adrénaline ampoules 1mg/ml 4ml= 4mg = 4 ampoules / aérosol

#### Références:

Cherry JD Croup, N Engl J Med 2008; 358:384-91  
 Bjornson CC, Johnson DW, Lancet, 2008; 371:329-339