

REANIMATION DU NOUVEAU-NE EN SALLE D'ACCOUCHEMENT

Degrés d'urgences obstétricales

Urgence 0 Menace vitale pour la mère et l'enfant. Le personnel interrompt immédiatement l'activité en cours pour se rendre en salle d'acc.

Urgence 1 Atteinte maternelle ou foetale, sans menace vitale immédiate mais nécessitant un accouchement proche (naissance dans les 30 min)

Urgence 2 : Intervention dans un délai convenant à la patiente et à l'équipe (naissance dans les 2 h)


ENSEMBLE 2004

Temps
approximatif

30
s
e
c
o
n
d
e
s

30
s
e
c

30
s
e
c



Taille du tube endotrachéal

Poids (kg)	Age gest (sem)	Tube (mm)	Tube (cm)	Tube ora (cm)#
<1	<28	(2)-2.5	7-7.5	6-7
1-2	28-34	3	7.5-9	7-8
2-3	34-38	3.5	9-10.5	8-9
>3	>38	3.5-4	11	9-10

lèvre sup

* Intubation à considérer à plusieurs étapes

FC < 60

Efficacité ventilation
Efficacité traitements : massage, intubation, adrénaline
Malformations : v aériennes, poumon et coeur
Conditions particulières: hypovolémie, pneumothorax, hernie diaphragmatique

