

1^{ère} génération

→ Sédatifs ++

Chlorphéniramine
(Pic : 2-6h; T_{1/2}: 13-30h)

Dimétindène
(Dbt: 30 min. Pic : 2-5h; T_{1/2}: 6h)

Doxylamine
(Pic : 1.6-2.4h; T_{1/2}: 10-12h)

Ketotifène
(Pic : 2-4h; T_{1/2}: 3-5h + 21h)

Oxomémazine
(Pic : ?; T_{1/2}: ?)

Hydroxyzine
(Pic : 2h; T_{1/2}: 13+/-4h)

(El anticholinergique vestibulaire)

Diphenhydramine
(Pic : 1-4h; T_{1/2}: 5h)
Sédation marquée
Pas recommandé pour cinétose chez l'enfant

Dimenhhydrinate
(Dès 2 ans; Pic : 0,5-1-3h; Effet: 4-6h)

Meclozine
(Pas 1^{er} choix si < 6 ans
Pic: 1-3h; T_{1/2}: 6h ; effet 12-24h)

Sédation

- **Arbid®gttes**: IVRS, RCA
- **Solucalm®** (+NAC): toux grasse
- **Triofan rhinite®**(+phényléphrine) caps retard: IVRS, RCA

- **Feniallerg® gttes, gel**: urticaire, RCA, allergies, prurits (varicelle, insecte, cholestase)
- **Otriduo®; Vibrocil® sprays** (+phényléphrine): RCA avec prurit

- **Sanalepsi® gttes**: nervosité à endormissement, RCA
- **Cariban®caps** (+pyridoxine) ret.: N/V pd grossesse
- **VICKS MediNait®** (+paracetamol, dextrométhorphan, Ephedrine): Sd grippal

- **Zaditen® cpr**: urticaire chronique, RCA, DA)

- **Toplexil® sirop**: antitussif, mucolytique

- **Atarax® sirop, cpr.**: troubles anxieux; prurit

- **Benocten® cpr, gttes**: tbl endormissement nerveux ou sur toux; prurit
- **Bonox®cpr**: tbl endormissement
- **Caladryl® lotion** (+ camphre et zinc): prurit cut.; coup de soleil piquûre d'insecte
- **Fenipic® gel, sol.** (+benzalkonium, menthol, dexpantenol : piquûres d'insecte
- **Makatussin® sirop, gttes** (+codéine !): toux irritative
- **Rhinitin® caps retard**: RCA

Traitement des cinétoses

- **Trawell® chewing gum**: cinétose

- **Itinerol B6® caps, supp.**: cinétose **mais n'est pas un anti-vomitif de référence** → cf. ondasetron

2^{ème} génération

Sédatif très léger à nul

Cétirizine
(Pic : 1-2h; T_{1/2}: 10 h)

Lévocétirizine
(Pic : 1h; T_{1/2}: 8h+/-2h)

Bilastine
(Pic : 1.3h; T_{1/2}: 14.5h)

Non sédatifs

Loratadine
(Pic : 2h; T_{1/2}: 8h+28h (→ desloratadine)

Desloratadine
(Pic : 3h; T_{1/2}: 27h)

Fexofenadine
(Pic : 1-3h; T_{1/2}: 11-15h)

DA: Dermatite Atopique
IVRS: Infection des Voies Respiratoires Supérieures
N/V: nausées/vomissements
RCA: Rhino-Conjonctivite Allergique

- **Cetallerg® cpr, gttes**: urticaire chronique, RCA
- **Zyrtec ®cpr, gttes**: urticaire chronique, RCA

- **Xyzal® cpr, gttes**: urticaire chronique, RCA

- **Bilaxten® cpr, solution**: urticaire, RCA

- **Claritin®cpr**: urticaire chronique, RCA
- **Lora®cpr**: urticaire chronique, RCA
- **Lorado®**: RCA

- **Aerius®cpr, solution**: urticaire, RCA

- **Telfast®cpr, sol**: urticaire chronique, RCA
- **Fexofenadine®cpr**: RCA
- **Fexo®** : RCA