

Définition d'un cas suspect de dengue, de chikungunya et de Zika (source : OMS)

Dengue	Chikungunya	Zika
Fièvre ET au moins deux des signes ou symptômes suivants : <ul style="list-style-type: none">- Nausées/vomissements- Éruptions cutanées- Céphalées- Myalgies ou arthralgies- Signes hémorragiques (test du tourniquet)- Leucopénie	Fièvre > 38.5°C ET arthralgie/arthrite sévère non expliquée par d'autres conditions médicales	Éruption cutanée (généralement maculopapulaire et prurigineuse) ET/OU fièvre ET au moins un des signes ou symptômes suivants : <ul style="list-style-type: none">- Conjonctivite (non purulente/hyperhémique)- Arthralgie- Myalgies

Pour les voyageurs :

Toute l'année :

- Face à des symptômes suspects dans les 2 semaines suivant le retour d'une zone endémique tropicale ou subtropicale, penser à **tester** ;
- Recommander aux voyageurs au retour de zone endémique tropicale ou subtropicale de ne **pas donner leur sang** pendant 4 semaines suivant retour de voyage.

Mesures supplémentaires entre les mois de mai et octobre :

- Face à des symptômes suspects dans les 2 semaines suivant le retour de pays d'Europe dans lesquels se produisent des flambées autochtones (France, Italie, Espagne), **penser également à tester** ;
- Recommander les **protections anti-moustiques** aux voyageurs au retour de zones endémiques tropicale et subtropicales, ou des pays d'Europe dans lesquels se produisent des flambées autochtones durant les 2 semaines suivant le retour.

Pour les cas suspects ou avérés de dengue, chikungunya ou Zika :

Toute l'année :

- Pour les cas avérés de dengue, chikungunya ou Zika, remplir les **formulaires de déclaration obligatoire** disponibles sur le site de l'OFSP et les envoyer à declarationsobligatoires@hopitalvs.ch dans les 24 heures suivant le diagnostic ;
- Pour les cas avérés de dengue, chikungunya ou Zika, recommander de ne **pas donner de sang** durant les 4 semaines suivant le diagnostic ;
- Pour les cas suspects ou avérés de **dengue**, éviter la prise d'acide acétylsalicylique (aspirine) ou d'anti-inflammatoires en raison du risque accru d'hémorragie, mais recourir en priorité au **paracétamol** ;
- Pour les cas avérés de dengue âgés de 4 ans et plus, proposer la **vaccin Qdenga®** en cas de séjour ultérieur dans une région où la transmission de dengue est élevée pour éviter la contamination par un autre sérotype et limiter le risque de dengue sévère (intervalle minimal de 6 mois entre infection et vaccination) ;
- Pour les cas suspects ou avérés de **Zika**, recommander l'utilisation du **préservatif** durant les relations sexuelles pendant au moins deux mois après le début des symptômes, ou durant toute la durée de la grossesse si une partenaire est enceinte;
- Pour les cas suspects ou avérés de **Zika chez une femme enceinte, référer au gynécologue** pour les examens gynécologiques appropriés.

Mesures supplémentaires entre les mois de mai et octobre :

- Dès la **suspicion** d'un cas de dengue, chikungunya ou Zika vivant ou travaillant à Monthey, Collombey-Muraz, Massongex, Fully ou Sierre (quartier Tservetta), la notifier à l'UCMT afin que des mesures antivectorielles puissent être mises en œuvre au plus vite : maltrans@hopitalvs.ch ou **027 603 89 90** ;
- Recommander les **protections anti-moustiques** aux cas de dengue, chikungunya et Zika importés durant une semaine après le début des symptômes, ainsi qu'aux personnes ayant voyagé avec eux (co-voyageurs) ;
- Recommander l'**élimination de tout récipient** pouvant recueillir de l'eau tel que les arrosoirs, les soucoupes de pots de fleurs (ou les remplir de sable), les seaux, les pneus, les gouttières, les bidons de récupération des eaux de pluie, etc. aux cas de dengue, chikungunya et Zika importés et à leurs co-voyageurs, particulièrement s'ils vivent à Monthey, Collombey-Muraz, Massongex, Fully ou Sierre (quartier Tservetta) ;
- Ne pas exclure la dengue, le chikungunya et le Zika du diagnostic différentiel de patients vivant ou travaillant à Monthey, Collombey-Muraz, Massongex, Fully ou Sierre (quartier Tservetta), en cas de symptômes suspects **même en l'absence de voyage**.