Informations pour les professionnels de la santé

Vaccination et immunisation contre le RSV

2/2

Vaccination maternelle (Abrysvo®)

Dans les 3 cas ci-dessous, l'administration additionnelle de Beyfortus® est recommandée :

- Si l'accouchement survient moins de 14 jours après la vaccination, le transfert d'anticorps au nouveau-né peut être insuffisant → une dose de Beyfortus® est alors recommandée pour le nouveau-né.
- Si la femme enceinte a reçu Abrysvo® lors d'une grossesse précédente, aucun rappel n'est recommandé, en raison de l'insuffisance de données actuelles.
- 3. Si la femme enceinte est immunosupprimée

Immunisation passive par AcM (Beyfortus®)

- Enfant avec une infection confirmée à RSV durant la saison : ne doit plus revevoir de Beyfortus® lors de la même saison; exception: en cas de perte d'immunité humorale, une dose de Beyfortus est indiquée.
- En cas de vaccination maternelle par Abrysvo®: pas d'administration de Beyfortus®, sauf si:
 - Le vaccin a été administré < 14 jours avant l'accouchement
 - Le nourrisson est né avant 37 SG
 - La mère présente une immunosuppression (ex. VIH non contrôlé)
 - L'enfant présente une comorbidité exposant à une forme grave
 - L'enfant a une perte d'immunité humorale

RÔLE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les gynécologues, sages-femmes, pédiatres, généralistes et autres professionnels de santé sont invités à :

- Informer les futurs parents des deux options de prévention disponibles ;
- Planifier et proposer la vaccination maternelle au bon moment;
- Organiser l'administration de Beyfortus[®] selon le calendrier recommandé;
- Identifier les enfants à risque nécessitant une 2^e dose*.


RECOMMANDATIONS DE L'OFSP ET DE LA CFV

Période de naissance	Recommandations
1 ^{er} octobre.2025 au 31 mars 2026	Vaccination maternelle (Abrysvo®) entre les SG 32 0/7 et 36 0/7, ou Beyfortus® dès la naissance
1 ^{er} avril 2025 au 30 septembre 2025	Beyfortus®, le plus tôt possible dès le 1 ^{er} octobre 2025

* Voir <u>page 11</u>, bas du tableau

Cas

particuliers



Pour en savoir plus :

- Ge.ch : <u>Protéger</u>
 <u>votre bébé contre la</u>
 bronchiolite | ge.ch
- OFSP: <u>Virus</u>
 respiratoire syncytial
 humain (RSV)
 (admin.ch)
- OFSP: <u>VRS</u>: grossesse / enfants
- www.infovac.ch
- Si < 14 jours entre le vaccin et la naissance → transfert d'lg insuffisant
- Si facteurs de risque importants chez le nouveau-né

cant

1 dose vaccin (Abrysvo®) 32-36 SG --

1 dose AcM (Beyfortus®) après la naissance (maternité – pédiatres)

(maternité – pédiatres)

Adapté de C. Berger

> Octobre 2025 Genève SMC

