Hôpitaux Universitaires de Genève
Département de l'Enfant et de l'Adolescent
Edition 2010 – Drs W. Habre, C. Mamie

ANALGESIE PEDIATRIQUE

Médicaments	Doses/j	Max/j	Remarques
Paracétamol Nouveau-né Per os ou rectal Nourrisson/enfant Per os ou rectal **Paracétamol I.V.**	 10-15 mg/kg/dose, 4x/j 20 mg/kg/dose, 4x/j 15 mg/kg x 4	 60 mg/kg/j 90mg/kg/j	 Voie orale en priorité du fait biodisponibilité
AINS **Ibuprofen** Per os ou rectal **Ketorolac I.V.**	 10mg/kg/dose, 3x/j 0.5 mg/kg/dose, 3x/j	 40 mg/kg/j	! Cave saignement Limitations d'emploi: < 9 mois Ketor : Pendant max 3 jours
MORPHINIQUES **Tramadol** Per os ou I.V. **Nalbuphine** i.v. bolus i.v. continu **Morphine** < 1 an, bolus > 1 an, bolus < 1 an, continu > 1 an, continu	 2 mg/kg/dose, 3x/j 0.05-0.1 mg/kg/dose 0.02-0.1 mg/kg/h 0.005-0.01 mg/kg/dose 0.05-0.1 mg/kg/dose 0.01 mg/kg/h 0.02-0.03 mg/kg/h		 Douleur moyenne à modérée Satu en continu Préférer PCA ou PPNCA à pompe en continu PO tripler la dose
Pour une antalgie prolongée -chez un enfant de < 1 an → PCA de nubaine -chez un enfant de > 1 an → PCA de morphine (Bip de l'anesthésiste de la douleur, 24h/24h : 6858 722)			